

Corthylus papulans: *Oblongo-ovalis*, *thorace semielliptico*, *latitudine vix longiore*, *marginē apicali rotundato*, *carinula subgranulata transversim ornata*, *supra antice asperato postice laevi*, *elytris thorace quarta parte longioribus*, *subtilissime vage punctatis*, *postice subintegris*, *declivitate postica convexa tuberculis (2—3) vix conspicuis a sutura aequē remotis ornata*, *marginē apicali suturaque (subtilissime granulata) elevatioribus*. — Long. $1\frac{1}{2}$ Lin. — Patria: Brasilia.

Mas (?): *fronte excavata*, *antennarum capitulo pilis falcatis longe pennicillato*.

Fem. (?): *fronte convexa*, *capitulo antennarum simplici*.

Neue exotische Xyleborus-Arten.

Xyleborus declivis (Chapuis in coll.): *Ferrugineus nitidissimus*, *thorace cylindrico postice subtilissime vage punctato*, *elytris subtilissime lineato-punctatis*, *interstitiis laevigatis planis postice oblique truncatis*, *truncaturae spatio subcirculari plano*, *denticulis duobus majoribus utrinque a sutura aequē remotis subarmata*, *ambitu granulis dispersis ornato*. — Long. 2 Lin. — Patria: Teapa.

Xyleborus amplicollis (Chap. i. coll.): *Elongatus*, *cylindricus*, *ferrugineus*, *nitidus*, *thorace cylindrico subampliato*, *lateribus vix rotundatis*, *postice subtiliter vage punctulato*; *elytris lineato-punctatis*, *interstitiis laevibus*; *declivitate postica planiuscula punctulata*, *papillis utrinque tribus ornata*, *una scilicet supra ad suturam*, *duabus alteris (superna et mediana) interstitio tertio sitis*, *interstitio secundo inermi*. — Long. 1 Lin. — Patria: Porto Rico.

Xyleborus alternans (Chap. i. coll.): *Brunneo-ferrugineus*, *thorace cylindrico postice rarius subtilissime punctato*; *elytris subtiliter lineato-punctatis*, *interstitiis subaeque crebriusque seriato-punctatis*; *declivitate postica convexa*, *subruguloso-punctata nitida*, *interstitiis utrinque primo et tertio denticulis distantibus subaequalibus ornata*; *interstitio secundo inermi*. — Long. $1\frac{1}{2}$ Lin. — St. Domingo.

Xyleborus badius Dupont (?): *Ferrugineus*, *thorace cylindrico*, *postice rarius subtiliter punctulato*, *elytris stricte punctato-striatis*, *interstitiis punctorum serie ornatis*, *pone medium granulatis*; *depressionē postica convexa subruguloso-punctata*, *nitida*, *interstitiis primo et tertio utrinque granulis distantibus subaequalibus ornata*, *interstitio secundo inermi*, *subimpresso*. — Long. 1 Lin. — Patria: Madagascar. St. Mauritius.

Xyleborus propinquus: Piceo-ferrugineus, thorace antice infuscato, cylindrico, postice distincte punctato; elytris subtilissime lineato-punctatis, interstitiis subrugulosis subtilissime punctorum serie subornatis; declivitate postica convexa ruguloso-punctata nitida, interstitiis primo et tertio granulis minutis ornata, interstitio secundo integra. — Long. $1\frac{1}{4}$ Lin. — Patria: Amer. bor.

Xyleborus posticus (Chap. i. coll.): Subelongatus, cylindricus, piceus, antennis pedibusque ferrugineis, thorace subquadrangularem postice subtilissime punctato; elytris striato-punctatis interstitiis punctorum serie ornatis; declivitate postica leviter striata, interstitiis omnibus ante medium tuberculis seriatim ornata. — Long. $1\frac{1}{3}$ Lin. — Patria: Carracas.

Xyleborus grandis (Chap. i. coll.): Subelongatus, thorace subquadrangularem gibbo disco subnodoso, postice confertim punctato, elytris punctato-striatis, interstitiis rarius subtiliter lineato-punctatis, declivitate convexa, interstitiis omnibus tuberculis acutis seriatim adpersa. — Long. $2\frac{1}{2}$ Lin. — Patria: Columbia.

Xyleborus subcostatus (Chap. i. coll.): Oblongo-elongatus, brunneus, thorace subquadrangulo antice in medio granulis submucronato, disco subnodoso postice rugulis transversis rarius adperso, elytris rugulosis, fortiter crenulato-striatis, interstitiis subcostatis seriatim fulvo-pilosellis; declivitate postica seriatim granulata, interstitio secundo utrinque spinula medianam armata. — Long. 2 Lin. — Patria: Siam.

Xyleborus curtulus (Chap. i. coll.): Breviter-cylindricus, thorace semicirculari postice subtilissime rarius punctato, lineola ante scutellum dense hirta; elytris striato-punctatis, interstitiis rarius seriatim punctulatis, postice oblique subtruncatis, declivitate convexa seriatim punctata setosaque, margine laterali subtilissime granulata. — Long. vix $\frac{2}{3}$ Lin. — Patria: Brasilia.

Xyleborus capucinus (Chap. i. coll.): Oblongus, thorace semielyptico gibbo antice in medio granulis prominentibus ornato postice confertim punctato; elytris longitudinaliter aequae convexis (subpulvinatis) confertim subtiliter punctatis, postice longius pilosellis subtilissime striatis, interstitiis subintegris. — Long. $1\frac{1}{4}$ Lin. — Patria: Guadeloupe.

Xyleborus rufithorax (Chapuis i. coll.): Oblongus, obovatus, rufus, oculis elytris piceis, thorace subquadrato lateribus ante medium rotundato, postice profundius confertim punctato; elytris subtiliter vage punctatis, declivitate postica convexa hirtella, granulis subconfertim adpersu. — Long. $1\frac{1}{2}$ Lin. — Patria: Brasilia.

Xyleborus retusus (Chap. i. coll.): *Perbrevis, ater, ore, antennis pedibusque ferrugineis, thorace amplo suborbiculari, gibbo, postice confertim subtiliter punctato; elytris thorace brevioribus subtiliter sparsim punctatis postice abrupte truncatis; declivitatis ambitu circulari acute elevato-marginato, spatio sparsim punctato.* — Long. $1\frac{1}{3}$ Lin. — Patria: N. Fribourg. (Mus. Chap.)

Xyleborus insignis: *Oblongus, subcylindricus, piceus, antennis pedibusque ferrugineis, thorace subquadrato, luteribus ante medium rotundato, margine antico medio crenulato, postice rarius subtilissime punctato; elytris subtilissime lineato-punctatis, interstitiis latis rarius subtilissimeque seriatim punctatis; declivitate postica oblique excavata, excavatione ante medium elytrorum incipiente, spatio ruguloso-punctato, supra utrinque dente valido a sutura remoto armato, margine laterali subserrato lineaque abbreviata acute serrata inter ambitum et dentem subornato.* — Long. $1\frac{2}{3}$ Lin. — Patria: Cayenne. (Mus. Chap.)

Xyleborus squamulatus (Chap. i. c.): *Oblongo-ovalis, piceus antennis pedibusque ferrugineis, thorace postice subtiliter rarius punctato; elytris striato-punctatis, interstitiis rarius seriatim punctatis, postice oblique impressis, impressionis spatio squamulis fulvis dense oblecto, margine laterali granulis acutiusculis subserrato.* — Long. 1 Lin. — Patria: Brasilia.

Xyleborus abnormis: *Oblongus, piceus, antennis femoribusque ferrugineis, thorace suborbiculari gibbo, postice sublaevi, elytris confertim punctatis, oblique truncatis, truncatura pone scutellum incipiente, spatio ruguloso-punctato, margine laterali utrinque fortiter trispinoso suturaque elevatis; spina prima valida in medio elytrorum sita.* — Long. $1\frac{1}{4}$ Lin. — Patria: Ceylon.

Xyleborus horridus (Chap. i. c.): *Oblongus, subcylindricus, rufoferrugineus, elytris infuscatis flavo-hirtis; thorace subtransverso, antice rotundato, postice profundius confertim punctato; elytris subtiliter striato-punctatis interstitiis vage punctatis; declivitate postica ad suturam impressa spatio confertim ruguloso-punctato, spinulis utrinque subsuturalibus acutis, alteris minutis ab ambitu granulato remotis ornata.* — Long. 2 Lin. — Patria: Mexico.